

## Manejo del GLUCAGON

**Todo paciente** tratado con insulina debería **tener disponible en su domicilio glucagón.**

**Indicaciones:** Hipoglucemia severa (inconsciente, convulsiones o si no puede tragar ni líquidos ni comida por el mismo.)

**Dosis:** 0.1 mg/10 kg. de peso (1 mg/ml de solución)

**El efecto será** dentro de 10-15 min.

**El efecto pasará** a los 30-60 min. Comer algo cuando se encuentre mejor para mantener la glucosa en sangre hasta la próxima comida, pero no comer demasiado de una vez.

**Efectos secundarios:** náuseas. Esperar mínimo 30 min antes de comer para evitar este problema.

**No repetir la dosis!** Una inyección consigue el nivel suficiente de glucagón en tu cuerpo.

La **pérdida de efecto** puede ser causada por:

Ejercicio  
Hipoglucemia Reciente  
Descenso del consumo de alimentos.  
Por ejemplo: Enfermedad

### **O POR:**

Alcohol  
Alta dosis de Insulina

**Siempre llevar el glucagón con uno.** Ejem: cuando viajes, sea donde sea y por el período de tiempo que sea.


**Enseña a las personas cercanas** a ti como administrar glucagón.

**No tema equivocarse al administrar glucagón.** Realiza el mismo efecto si lo inyectas subcutáneo o intramuscular.

# Glucagon-Gen HypoKit

Rápida respuesta a la hipoglucemia grave

# 1



Retirar la tapa de plástico naranja del vial.

# 2



Quitar el capuchón de la aguja e inyectar todo el líquido de la jeringa en el vial.

# 3



Sin retirar la jeringa y la aguja, agitar suavemente el vial hasta que Glucagon-Gen esté completamente disuelto.


# 4



Extraer toda la solución en la jeringa.

# 5

Injectar subcutáneamente. Si la inyección fuera intramuscular o intravenosa no ocasionaría ningún riesgo al paciente.



Si necesita más información,  
llame al teléfono de

**INFONOVO:**

**900 - 55 00 55**